


NOUVEAUX CRITÈRES DE DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE



2013

Prédiction de l'évolution vers une polyarthrite séropositive

ATTEINTE ARTICULAIRE	SCORE
• Antécédent familial de PR au premier degré	1 POINT
• Consommation d'alcool	1 POINT
• Durée des symptômes moins de 12 mois	1 POINT
• Symptômes intermittents	1 POINT
• Arthralgie des mains et des pieds	1 POINT
• Intensité de la douleur, VAS > ou égal 50	2 POINTS
• Raideur matinale > 1 heure	1 POINT
• Gonflement d'une articulation	1 POINT
AUTO-ANTICORPS	
• Facteurs rhumatoïdes négatifs / CCP3 négatifs	0 POINT
• Facteurs rhumatoïdes négatifs / CCP3 positifs < 150	2 POINTS
• Facteurs rhumatoïdes négatifs / CCP3 positifs > 150	3 POINTS
• Facteurs rhumatoïdes positifs / CCP3 positifs > 150	4 POINTS

Ref. Ann Rheum Dis. 2012 Nov; 28:
A prediction rule for the development of arthritis in seropositive arthralgia patients. (Van de Stadt LA, Witte BI, Bos WH, Van Schaardenburg D.) 1 Department of Rheumatology, Jan van Breemen Research Institute Reade, Amsterdam, The Netherlands.

Calcul du risque de développement d'une PR

Score:	0-4 POINTS	5-6 POINTS	7-13 POINTS
1 an	3%	17%	43%
2 ans	7%	29%	63%
3 ans	7%	38%	74%
4 ans	12%	38%	81%
5 ans	12%	44%	81%

Une valeur seuil de 6 permet de séparer les patients qui ont un fort risque de voir l'affection évoluer vers une forme chronique et destructive.

IMPLICATION DES ANTICORPS ANTI-PROTÉINES CITRULLINÉES DANS LE MÉCANISME PHYSIOPATHOLOGIQUE DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

