

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">KETTERHILL</div>	ANNEXE HGPO TEST (ORAL HERBEIGEFÜHRTE HYPERGLYKÄMIE)			
	Identification A_MO_PREL_38_A	Approbateur Valérie GIGOT	Date d'application 07/05/2024	Version 5

1. Vorgehensweise ?

Matériel	75 g flüssige Glukoselösung (oder 100 g auf ärztliche Verschreibung)
Vorsichts- massnahmen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sich über Nüchternheitszeitraum von 12 Stunden vergewissern ▶ Die Grammzahl der vom Patienten eingenommenen Glukoselösung notieren ▶ Sich vergewissern dass der Patient während der Testdauer sitzen bleibt, ohne zu essen, und zu rauchen ▶ Während der Testdauer möglichst nichts trinken. Ausser, von Fall zu Fall abhängig, um die Nebenwirkungen der Glukose zu mindern (Übelkeit, klebriger Mund) und um erbrechen zu vermeiden, darf der Patient ein paar Schluck Wasser trinken (max 1 Becher) ▶ Sich vergewissern dass der Patient eine normale körperliche Aktivität und eine normale glukoshaltige Ernährung innerhalb der letzten 3 Tage hatte. ▶ Sich ebenfalls vergewissern dass keine Magenoperation vorliegt (Magenband, Bypass, Gastrosleeve) und kein Diabetes bekannt ist ▶ Informationen über familiäre Diabetes Vorerkrankungen sammeln <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, liegt der vom Patienten einzunehmende Glukosewert bei 75 g Wenn der Patient (Kind oder Erwachsener) unter 43 kg wiegt, die Dosis von 1,75 g Glukose/kg oder 4,7 ml/kg einer Lösung von 75 g anpassen (Flasche von 200 ml) Zum Beispiel : ein Kind von 30 kg muss 1,75 g x 30 oder 52,5 g Glukose, das entspricht 141 ml (³/₄ einer Flasche) einnehmen Die verabreichte Menge auf das Nachverfolgungsetikett notieren ▶ Testdauer : <ul style="list-style-type: none"> • Schwangere Patientin → 2 Stunden • Andere → 2 Stunden • Wenn mehr als 2 Stunden Testdauer vom Arzt verschrieben sind → beträgt die maximale Dauer 3 Stunden
Protokoll	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Die Schwangerschaftswoche auf das Nachverfolgungsetikett notieren <p>T0 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Blutentnahme ▶ Bei verschriebenem Urintest, den Urin vor der Glukoseeinnahme sammeln ▶ T0 auf das Röhrchen schreiben ▶ Glukoseeinnahme vom Patienten, innerhalb von 2 - 5 Minuten <p>T60, T120 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Blutentnahme ▶ T60 und T120 auf das jeweilige Röhrchen notieren <p>Kommt es zwischen T0 und T30 zu erbrechen, ist der Test abubrechen. Darüber hinaus, kann der Test weiter geführt werden. Das Erbrechen auf das Nachverfolgungsetikett notieren</p>

	ANNEXE			
	HGPO TEST (ORAL HERBEIGEFÜHRTE HYPERGLYKÄMIE)			
Identification A_MO_PREL_38_A	Approbateur Valérie GIGOT	Date d'application 07/05/2024	Version 5	Page 2 / 2

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
19.10.21	1	Erstausgabe
30.03.23	2	Vorgehensweise zur Wasseraufnahme während des Tests.
24.07.23	3	Blutentnahme bei T0 hinzugefügt.
29.01.24	4	Wenn mehr als 2 Stunden Testdauer vom Arzt verschrieben sind, beträgt die maximale Dauer 3 Stunden.
11.04.24	5	Übersetzung ins Deutsche.