

KETTERHILL	ANNEXE O'SULLIVAN TEST			
Identification A_MO_PREL_38_B	Approbateur Valérie GIGOT	Date d'application 08/05/2024	Version 2	Page 1 / 1

1. Vorgehensweise ?

Frühzeitige Erkennung von Schwangerschaftsdiabetes

Material	50 g flüssige Glukoselösung
Vorsichts- massnahmen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vorzugsweise morgens ▶ keine vorgeschriebene Nüchternheit ▶ Patientin muss während der Testdauer sitzenbleiben, ohne zu essen oder zu rauchen ▶ Während der Testdauer möglichst nichts trinken. Ausser, von Fall zu Fall abhängig, um die Nebenwirkungen der Glukose zu mindern (Übelkeit, klebriger Mund) und um erbrechen zu vermeiden, darf die Patientin ein paar Schluck Wasser trinken (max 1 Becher) ▶ Sich vergewissern dass die Patientin eine normale körperliche Aktivität und eine normale glukoshaltige Ernährung innerhalb der letzten 3 Tage hatte ▶ Sich ebenfalls vergewissern dass keine Magenoperation vorliegt (Magenband, Bypass, Gastrosleeve) und kein Diabetes bekannt ist ▶ Informationen über familiäre Diabetes Vorerkrankungen sammeln
Protokoll	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Testdauer → 1Stunde ▶ Die Schwangerschaftswoche auf das Nachverfolgungsetikett notieren <p>T0 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Blutentnahme ▶ T0 auf das Röhrchen schreiben ▶ Patientin muss jetzt die 50 g Glukose innerhalb von 2 - 5 Minuten trinken <p>T60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Blutentnahme ▶ T60 auf das Röhrchen schreiben <p>Kommt es zwischen T0 und T30 zu erbrechen, ist der Test abubrechen. Hinaus, kann der Test weiter geführt werden. Das Erbrechen auf das Nachverfolgungsetikett notieren</p>

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
19.10.21	1	Erstausgabe
11.04.24	2	Im Abschnitt "Vorsichtsmaßnahmen" hinzugefügt : <ul style="list-style-type: none"> - der Bedingungen für die Aufnahme von Getränken. - der Bedingungen für körperliche Aktivität und die Aufnahme von Kohlenhydraten. - der Abwesenheit von bariatrischen Operationen und bekanntem Diabetes. - der Suche nach einer Familienanamnese für Diabetes. Im Abschnitt "Protokoll" hinzugefügt : <ul style="list-style-type: none"> - die Dauer des Tests. - der Eintragung des Schwangerschaftswoche auf dem Nachverfolgungsetikett. Übersetzung ins Deutsche.