

	ANNEXE PRELEVEMENT DES YEUX ET ANNEXES			
	Identification A_MO_PREL_40_F	Approbateur Laurence AULOGE	Date d'application 09/07/2024	Version 2

1. Comment procéder ?

Recherche de germes responsables de lésions des yeux et leurs annexes.

Matériel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gants sans talc ▶ Ecouillons DACRON / SWAB ▶ Flacon stérile ▶ Sérum physiologique
Précaution	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avant toute instillation de collyre ou 48 heures après l'application de pommade ophtalmologique ▶ Mettre des gants
Protocole	<p>Œil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiliser un écouvillon SWAB pour prélever au niveau de l'angle interne de l'œil et de la face conjonctivale de la paupière inférieure en écartant celle-ci <p>Paupière</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Frotter la lésion avec un écouvillon SWAB <p>Herpès PCR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Humidifier un écouvillon DACRON au sérum physiologique pour enlever croûtes, pus ou suintement et le jeter ▶ Avec un second écouvillon DACRON ou SWAB, frotter le plancher de la lésion. En l'absence de lésion, prélever la face interne de la paupière

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
08.08.22	1	Première édition
27.06.24	2	Volet "Matériel" : suppression de la pince à épiler. Volet "Protocole" : - suppression du prélèvement à l'aide de la pince à épiler remplacé par un frottis de la lésion (paupière). - utilisation possible de l'écouvillon SWAB pour la recherche d'herpès PCR.