

KETTERHILL	ANNEXE WUNDABSTRICH - HAUT			
Identification A_MO_PREL_40_M	Approbateur Laurence AULOGE	Date d'application 15/07/2026	Version 5	Page 1 / 2

1. Vorgehensweise ?

Nachweis pathogener Keime, welche nicht mit den kommentierenden Bakterien zu verwechseln sind

Material	➤ puderfreie Handschuhe ➤ Überzugskittel ➤ SWAB und standard Abstrichröhrchen ➤ physiologische Kochsalzlösung ➤ Kompressen ➤ Kürette ➤ Nadel, falls erforderlich ➤ Klinge ➤ Klingenhalter ➤ Transparentes Klebeband (wie Scotch)
Vorsichts- massnahmen	➤ Ausserhalb jeglicher lokal oder generellen Antibiotikabehandlung ➤ Wunde vorher gut mit physiologischer Kochsalzlösung und Kompressen reinigen und Exsudat entfernen
Protokoll	➤ Handschuhe anziehen ➤ Überzugskittel für die Entnahme von <i>Sarcoptes</i>
	Bakteriologie ➤ SWAB Abstrichstäbchen benutzen, um die Mitte der Wunde abzureiben, durch drücken in der saubersten Wundzone, und drehen auf einem 1 cm² um möglichst viel Wundsekret aufzunehmen (Levine Technik)
	Herpes PCR Test ➤ Ein standard Abstrichstäbchen mit physiologischer Kochsalzlösung befeuchten, um Krusten, Eiter oder Wundflüssigkeit zu entfernen, und entsorgen Sie ihn ➤ Mit einem zweiten SWAB Abstrichstäbchen die Läsion abreiben
	Sarcoptes (<i>Sarcoptes scabiei</i>, Erreger der Krätze) ➤ Wählen Sie eine frische, typische Läsion, die einer roten Furche (Weg des Parasiten) entspricht und meist zwischen den Fingern, an den Handgelenken, Ellenbogen, Brustwarzenhöfen, am Gesäß oder an den Genitalien zu finden ist ➤ Kratzen Sie die Läsion mit einer Kürette ab, bis Sie etwas Kruste (oberflächliche Schicht der Epidermis) oder klare seröse Flüssigkeit erhalten. ➤ Die Entnahme kann unangenehm sein, sollte jedoch keine Blutung verursachen ➤ Das entnommene Material auf einer Klinge geben (Bei Bedarf mit einer Nadel) und mit durchsichtigem Transparentes Klebeband (wie Scotch) abdecken. Das Klebeband muss unbedingt durchsichtig sein, da die Untersuchung unter dem Mikroskop erfolgt ➤ Den Klinge in einem Klingenhalter aufbewahren

	ANNEXE PRELEVEMENT DE PLAIE - PEAU			
Identification A_MO_PREL_40_M	Approbateur Laurence AULOGE	Date d'application 15/07/2026	Version 5	Page 2 / 2

2. Historique

Date de mise à jour	Version	Nature des modifications
11.08.22	1	Erstausgabe
01.07.24	2	Abschnitt "Material" : Kompressen hinzugefügt. Abschnitt "Vorsichtsmassnahmen" : Reinigung der Wunde vor der Entnahme. Abschnitt "Protokoll" : Levine Technik für Bakteriologie.
06.01.26	3	Abschnitt "Protokoll" : Hinzufügen der Entnahme für die Suche nach Sarcoptes (Erreger der Krätze).
25.03.26	4	Überzugskittel für die Entnahme von Sarcoptes.
06.07.26	5	Swab-Tupfer anstelle von Dacron für die Herpes-Probenentnahme Bei Bedarf zusätzliche Nadel für die Sarcoptes-Probenentnahme mit Kürette